


~~ARC 52~~
Anévrysme faux
La ligature de l'artère tibiaie postérieure.



ARC 52 n° 105



Lu 10 Le 10 xbe 1789

du 2^o

[Signature]

Observation Sur un Anévrysme faux
de l'artère tibiales Postérieure

Les anévrysmes faux de l'artère tibiales postérieure
ont toujours paru redoutables par la difficulté de
Reconnoître le lieu précis de l'ouverture de l'artère,
Et par la difficulté plus grande encore d'y porter une
ligature.

Une observation oculée succéda à cet égard, m'a
parue pouvoir fixer un moment l'attention de
l'Académie.

Le 21^{er} juin 1787 le nommé Jacques plainchaud
aisiné naitif de Nantes âgé de 61 ans fut
blessé à la jambe par un couteau de cuisine. le
couteau dirigé de bas en haut, eut son entrée ^à dans
~~la partie~~ ^{la} ~~inférieure~~ ^{partie} inférieure postérieure à un peu interne
de la jambe gauche.

Le blessé ressentit d'instinct une vive douleur
qui fut suivie de l'effusion d'une goutte de sang
de sang; on appliqua sur la partie des compresses
trempées dans l'eau marinée soutenues par un
bandage asse serré; Les Chirurgiens appellés suivirent
le même traitement.

Le lendemain la lamification étoit considérable;
les douleurs devinrent plus vives, la jambe parut
subitement d'un rouge violet.



Stagnation rapide des accidens déterminant
 cinq saignées rapprochées les unes des autres; les
 Emollients & calmans furent employés. M^{rs}
 Pelletan & l'heritier furent consultés; le traitement
 de la maladie ne leur échappa point; & il
 Annonçant un anévrysme. le malade fut
 transporté à l'hôpital de la Charité le vingt neuf
 Suivant, dix neuf jours de la blessure.

J'examinai la jambe; elle étoit énormément
 gonflée dans toute son étendue & livide. Dans
 toute sa face interne. la plaie faite par le couteau
 étoit cicatrisée: les vaisseaux cutanés qui s'empeignent
 sur le pied & sur la malléole interne étoient de
 couleur livide. ~~Il étoit difficile de le trouver~~
 la fluctuation étoit sensible, sans pulsation.
 Il étoit difficile de le trouver sur la nature de la
 maladie, ou du moins on étoit fondé à soupçonner
 un anévrysme. Depuis le moment de la blessure
 le malade n'avoit joui d'aucun repos; il éprouvoit
 les douleurs les plus vives. L'ouverture de la tumeur
 étoit urgente.

Je fis à la face interne moyenne de cu peu
 inférieure à celle de la jambe une longue &
 profonde incision pénétrant jusques dans
 le foye; cet ouverture faite, le sang sortit
 avec impétuosité: Une bande roulée & placée
 sur l'artere crurale à l'aîne, suspendit le cours
 du sang. la partie fut débarrassée des caillots

+ la femme
 de Jules etc

+ une partie
des muscles
qui

3

qu'elle contenait; leur quantité prodigieuse
avoit écarté de l'artère ⁺ les muscles qui l'environnent
et remplissoient un intervalle considérable que
l'on peut concevoir entre le muscle soléaire,
et les muscles fléchisseurs des orteils, jambier
postérieur, et long fléchisseur propre du gros orteil.
La direction précise de l'instrument qui avoit
intéressé l'artère n'étant inconnue, je ne pouvois
savoir la quelle des deux artères, de la peronière
ou de la tibiales postérieures étoit ouverte; je
plai^{ment} mon doigt indicateur de la main
gauche dans toute l'étendue que parcourent
ces artères dans la fosse, la faisant s'insinuer la
intérieur suspendre la compression sur la crurale.
Après plusieurs tâtonnements, mon doigt à la fin
se trouva placé sur l'ouverture de l'artère que
je reconnus être la tibiales postérieure, et l'extrémité
de mon doigt, dans cet endroit, appuyant sur la
face postérieure du tibia, et ouverture se trouva
être à la partie supérieure de la plaie un peu
plus bas que la partie moyenne de la jambe. avant
de faire la ligature, mon doigt toujours placé
sur l'ouverture de l'artère, et la pression sur la
crurale suspendue, je sentis avec mon doigt
indicateur de l'autre main, la pulsation de la
peronière & mesurai ^{par} à peu près la distance de la
tibiales postérieure; le parcourant avec le même doigt
le trajet que parcoureroit l'éguille, je m'aperçus
qu'il me seroit impossible de passer l'éguille
devant l'artère & d'en faire sortir la pointe au



4
Dehors de la plaie; Et même d'éviter d'blesser
l'artère peronière ^{ou} ~~le~~ de la comprendre dans
la ligature. La profondeur de l'artère augmentée
Encore par le gonflement énorme de la jambe,
me fit regarder cette ligature comme imprati-
quable. il falloit cependant prendre ce parti ou
celui de l'amputation; celui-ci étoit la dernière
^{ressource}
^{moyen}, j'attachai le premier à quelque prix que
ce fut. Je vis qu'un moyen de réussir, celui
de me faire passage entre le tibia & le peroné,
En incisant le ligament interosseux pour y
introduire l'éguille & les fils de la ligature, &
cela à l'aide d'une petite incision à la partie
opposée. Dans cette opération, j'avois à ménager
près l'artère ouverte, l'artère peronière qui, comme
on sçait, s'amppe dans cette partie de la jambe entre
le long flechisseur du gros orteil, le jambier postérieur
& le solaire le long de la partie postérieure interne
du peroné. Je l'avois reconnu comme je l'ai dit
plus haut, & à proprement même la distance de la
tibiale postérieure.

En pratiquant la petite incision, j'avois encore
à éviter la tibiale antérieure qui, dans cette partie
de la jambe, s'amppe derrière le jambier antérieur
entre lui & le long extenseur du gros orteil; & qui
se trouvant près le bord externe du tibia, pouvoit
être intéressée dans cette petite incision. La crainte
d'blesser cette artère, fit que l'incision à la face
externe de la jambe, ne fut pas celle que je l'avois
désirée; mon projet étoit de faire cette incision au

+ le long du
peroné

de l'angle 5

travers des muscles, peroniers le long du bord
antérieur du peroné, & le plus loin possible
de la tibiale antérieure; mais le gonflement
de la jambe étoit tel, que prenant mal mes
dimensions, j'ouvris le nouveau ^{angle} près de son
bord ~~postérieur~~ externe, mon point pris sur
la manière de faire la ligature, j'y procéda
comme il suit.

avant d'être mon doigt placé sur l'artère,
j'avois très exactement le lieu qu'il
occupoit, afin de le retrouver facilement; je fis
à la face interne de la jambe une incision
à la même hauteur que l'autre, & pénétrant
à travers les muscles qui couvrent le peroné,
je parvins jusqu'à lui; mais l'incision comme
je l'ai dit, se trouva sur le peroné même; j'en
corrigeai aussitôt que je le pus la direction,
en faisant d'abord le devant le bord de l'incision,
& dirigeant mon doigt de derrière en devant
je rejoignis le ^{angle} bord antérieur de cet os.
parvenu là, je replaçai l'extrémité du doigt
index de la main gauche dans la plaie de
la face interne de la jambe sur l'ouverture
de l'artère, & le portant plus profondément
possible vers le ligament inter-osseux, & plus
particulièrement l'angle, je fis sauter ~~en bas~~
le plus que l'on put le bord antérieur de l'ouverture
externe, & conduisant la pointe du bistouri à
la même hauteur que mon doigt, je portai ~~et~~



l'angle

le plat de cet instrument sur le bord antérieur
du peroné, le conduisant la pointe seulement
se parvins à travers le ligament inter-osseux
jusques à l'angle de mon doigt & la faisant
glisser sur cet angle, je les conduisis de concert,
Et sans la separee haut & bas & fis une ouverture
d'un bon pouce dans laquelle je passai avec
facilement ^(explorant) mon doigt. puis Ramenant
l'hémicirculaire du même doigt sur l'ouverture de
l'artère, je fis suspendre la compression, pour
m'affurer qu'il étoit bien placé; alors mon
doigt se place, j'ai saisi de la main droite
une grande aiguille courbe, éafilée; & la
concoûtée tournée vers ^{sur l'intérieur} les os de l'os iliaque, je
portai sa pointe quatre à cinq lignes au dessus
de mon doigt, le long de la face postérieure de
cet os de devant en arrière, à une f profondeur
de six à huit lignes environ; alors j'otai
mon doigt, & saisissant l'aiguille de la
main gauche, j'introduisis le doigt indicateur
de la droite dans la contre-ouverture, et cherchai
le passage qui se m'étois fait au travers du
ligament inter-osseux. Je conduisis la pointe de
l'aiguille vers mon doigt qui me dirigea la
marche, & je la ramena au dehors avec assez
de peine; l'incision se trouvant très postérieurement.
Reintroduisant ensuite le doigt indicateur de
la main gauche dans l'ouverture de la face
interne de la jambe entre le tibia & le peroné

+ que le nœud
fait un bout

je saisis avec des pinces à anneaux l'extrémité
du fil que j'avois lié, & le second nœud sur mon
doigt, je le fis repasser de dehors en dedans. le fil
dégagé de la pince que j'allois en place, on
fit avec l'autre extrémité du fil un nœud
simple & très lâche, le autre extrémité du fil
qui n'avoit point encore passé par la playe,
mise entre la tige des pinces, je la tirai de
dedans en dehors; de manière ⁺ qu'un bout du
fil se trouvoit sorti par l'ouverture de la face
interne de la jambe, & l'autre par celle de la
face externe: alors prenant les deux bouts du
fil par des incisiers, je tirai le nœud bien
inquiet de l'écarter de cette ligature, mais la
compression après, je vis avec satisfaction
qu'elle avoit cessé, le sang cessant absolument
de couler. Je repassant les fils de la même
manière, un second nœud assujettit le premier.
je me servis du même procédé pour une seconde
ligature au dessous de l'ouverture de l'autre. les
fils appartenant à l'une & l'autre ligature
sont distingués. j'observerai que pour éviter
la présence des fils à la playe externe, on fera
le dernier nœud au lieu de prendre l'extrémité du
fil pour le conduire de dedans en dehors, je le
pris par son milieu laissant à la playe de la
face intérieure après de fil pour le retirer, le
nœud étant fait. de manière que chaque
ligature ait ses fils à la playe de la face interne.
à cet effet je fis passer le fil par la face interne



qui du compandre d'une l'aune du fil jusqu'à
 toute la marche jambière postérieure & une partie
 de la marche long flechissure commune des artères
 traversées par l'incision faite au ligament inter-
 osseux, & selon toutes les apparences, le nerf tibial
 postérieur, pour plus de sûreté, je passai entre
 le tibia & le péroné, une bandelette de liège
 sur laquelle je plaçai deux morceaux d'aguirre
 que je conduisis le plus profondément possible,
 & sacrifiant les deux extrémités de la bandelette,
 je les croisi sur la partie antérieure de la
 jambe; mais avant de les fixer, je crus devoir
 établir une communication entre le foyer
 considérable qui s'étendait jusqu'à derrière le
 péroné, avec la partie interne de la jambe, par
 une ouverture faite à cette partie; afin que
 le pus qui par la suite, n'est pas manqué d'y
 se former, étant obligé de remonter contre son
 propre poids, ait une issue libre; cette ouverture
 qui fut entendue, j'en avais probablement été dans
 la nécessité de pratiquer. Je pratiquai pour cela
 de la contre-ouverture faite à la face externe
 de la jambe, & conduisit par deux de mes doigts
 dans le fond du foyer, je fis à une peu de
 distance du péroné, une ouverture au travers
 du bord interne du muscle soléaire qui est
 par où il borne le foyer du côté externe.
 J'établis entre lui & le péroné une ouverture libre

Dans la quelle je passai une Naudelle
de linge qui couvrait la jambe.

La cavité fut remplie de charpie brute & le
carniquest de un petit fut placé sous
l'arcade & prêt à être tenu Lucas de Besvins.

Malgré du malade, la constitution
cachectique, la maigreur & la faiblesse ne
m'indiquaient pas de grandes espérances de
guérison; mais, et probablement la faiblesse
qui l'a sauvé de grands accidents aux quels
j'aurais bien de m'attendre, & qui devaient
résulter du mauvais état de la partie &
des incisions profondes & étendues que j'aurais
faites. Le malade continue mieux allenda, eut
une bonne nuit, ce qui n'en lui étoit pas encore
arrivé depuis son accident, il éprouva un
soulagement sensible. & pendant le cours de
sa maladie il n'eut aucun accident effrayant.
Le lendemain la fièvre s'annonça un peu
plus forte, mais elle fut de peu de durée. Les
jours suivants l'opération, je débarrassai la
partie du linge & de la charpie qui le
détachait: ce ne fut que le huitième jour que
la plaie fut entièrement débarrassée du premier
appareil: la diffusion s'extériorisa, & le quinzième
jour entièrement & continué pendant presque
tout le cours de la maladie, furent les ulcères
employés. Les suppurations s'établirent. Je supprimai



+ Et s'adressant
les deux jours
si glisse

la Bandellette de linge, j'employai la
Charpie sèche & des compres trempés dans
l'eau & l'eau de vie, il se forma plusieurs
petits abcès à la place de la fure interne
de la jambe vers les commiffures, & plusieurs
fuyers particuliers sous les teguments & qui par
la pression se dégageoient dans la plaie.
La contrainction faite à la fure externe
de la jambe marcha d'un pas plus rapide
vers la guérison. Une tumeur dure &
douloureuse qui s'annonça à la partie supérieure
interne de la jambe parvint seulement à
suppuration, elle fut ouverte. Le vingt deuxies
jour de l'opération la ligature supérieure
parut chancelante; j'essayai à introduire
dans son anse une sonde canulée & ne pus
y parvenir. le treizieme jour j'y passai ⁺ & fis
glisser dans la canule la pointe mousse d'
argent ^{et} je coupai l'anne. huit jours après
j'débarassai la partie de la ligature inférieure
du procédé de la même manière. la jambe
paroissoit dans l'état le plus satisfaisant; le
dégorgement étoit complet. & cependant la guérison
marchoit avec la plus grande lenteur, ce que je
ne pouvois attribuer qu'à l'épuisement du malade;
ce ne fut que le quatrieme mois que la cicatrice
fut consolidée.

Le malade éprouva pendant le cours de
cette maladie surtout dans les deux premiers
mois, plusieurs diarrhées sans diminution
sensible de pus. ce ne fut qu'au bout de plus de
deux mois, qu'il put prendre un peu de
nourriture solide, alors la santé se rétablit
peu degrés; il prit du suc de la carotte
à qui influa infiniment sur la guérison.
La santé alors étoit tellement rétablie, qu'il étoit
méconnoissable; malgré mes attections à chaque
promenade, la jambe resta fléchie sur la cuisse.
L'extension étoit si douloureuse, qu'elle étoit
insupportable au malade; mais la cicatrice
faite, il essaya peu degrés à étendre sa jambe,
Et il ne l'étoit pas encore parvenu, lorsqu'il se
senti de l'hôpital entièrement guéri le dix huit
novembre suivant, après 7 avoir été cinq
mois.



q'avois envisagé comme un inconvénient
l'incision faite à la peau externe de la jambe
trop postérieurement, mais la promptitude avec
laquelle la communication faite à travers
le ligament inter-osseux, a été formée, m'aidant
plus de croire que due à la direction de cette
incision, que je dois l'attribuer. En effet
l'obliquité de cette incision faite de derrière en
devant, a dû produire cet effet. les parties
molles soulevées, purent pénétrer à travers le ligament

+ que celle
ordinaire pour
se mesurer
seuls avait

intéressant, abandonnées à elles mêmes, ont dû
Staphylé sur cette incision; & en empêchant
le passage de la matière purulente, favorisée la
Récidive. aussi dans un cas semblable, je
suivrois la même direction, mais l'opération être
plus difficilement mais seroit qu'elle seroit
moins, & le seroit d'une aiguille moins courbe
Que sa pointe, ayant aboré ⁺ celle avoit de la
tendance à se porter la devant, tandis que je
tentai à la diriger vers le bord ^{antérieur} du peroné.
Il est aisé de sentir que plus la lésion est
seroit l'entée supérieurement, plus elle seroit difficile,
Et qu'enfin elle deviendrait impraticable, par
la difficulté d'une part, de pénétrer impunément
au travers du ligament intra-osseux, ou d'une autre
de trouver la ribiale antérieure, & de l'autre la
postérieure que l'on trouve très près de la ribiale
postérieure. cependant en pareille circonstance
où le danger de pressant, ne pourroit-on pas la
lancer au risque d'y comprimer la peronière
qu'il seroit, je crois, moins facile d'éviter que la
libiale antérieure entre la quelle & le ^{Tibia} ~~peroné~~ on
pourroit diriger l'incision, mais alors il seroit
absolument nécessaire que l'incision extérieure
fut un peu en devant du bord antérieur du peroné,
& dans le cas de non succès, il reste toujours la
dernière ressource, celle de l'amputation.

J'ai fait entendre ici le malade qui fait
le sujet de cette observation; il est parvenu depuis
à étendre entièrement sa jambe; les cicatrices
sont toutes courtes & malades solides; mais
depuis à cette époque, il a éprouvé à cette partie des

13
La fluxions, Des Engorgemens lymphatiques
Le souvent des douleurs assez vives. Les mouvements
du pied le font encore avec difficulté, mais
tous ces accidens s'éloignent à proportion que
le sujet s'éloigne de l'époque de sa maladie.

10 Decembre 1787

J. J. M. J. J. J.



Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and mostly illegible due to fading and the texture of the paper. It appears to be a letter or a document, with several lines of text visible. The handwriting is cursive and somewhat slanted.